

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та інших ГРВІ в Сумській області

Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції

ЕПІДТИЖНІ 2026 РОКУ

40–41

ПЕРІОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ

25.09–08.10.2026

ТЕРИТОРІЯ

Сумська область

ДАТА ПІДГОТОВКИ

12 жовтня 2026 р.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРВІ

283,2

на 100 тис. населення · тиждень 41

▲ попередній тиждень: 261,0

ЗАРЕЄСТРОВАНО ВИПАДКІВ ГРВІ

2 927

за тиждень · тиждень 41

▲ попередній тиждень: 2 698

ЧАСТКА ШКОЛЯРІВ СЕРЕД ХВОРИХ

33,4

% · тиждень 41


▲ попередній тиждень: 32,4

ЧАСТКА ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ

3,4

% від усіх хворих на ГРВІ · тиждень 41

▲ попередній тиждень: 3,3



Захворюваність на грип та ГРВІ в області, на 100 тис. населення. Темна лінія: поточний сезон; сірі лінії: попередні сезони; пунктир: порогові інтенсивності.

Станом на 9 жовтня 2026 року в Сумській області циркуляція вірусів грипу не підтверджена.

ЗМІСТ

01	Захворюваність на грип та ГРВІ в області	2	03	Захворюваність за віковими групами	10
02	Ситуація в районах і територіальних громадах	2	04	Госпіталізація	13
			05	Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ	13

01 Захворюваність на грип та ГРВІ в області


Два тижні тому в Україні розпочався сезон захворюваності на грип та інші ГРВІ. На відміну від попередніх років, коли завершення літньої хвилі COVID-19 припадало на початок сезону та в окремих громадах навіть спричиняло перевищення епідемічних порогів, у 2026 році літньої хвилі цієї інфекції не спостерігалось. Міжсезоння також було епідемічно спокійним щодо інших збудників.

Зростання кількості випадків ГРВІ почалося у вересні одночасно з початком нового навчального року. На кінець 41 тижня в області було зареєстровано 2 927 хворих, що на 16,7 % менше, ніж за 41 тиждень попереднього сезону.

На 41-му тижні, у порівнянні із 40-м кількість випадків ГРВІ зросла на 229. Зареєстровано 2 927 хворих проти 2 698 (283,2 на 100 тис. населення проти 261). Темп приросту склав 8,5 % (рис. 1).

РИСУНОК 1

Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезонах 2024-25, 2025-26 та 2026-27 рр.




02 Ситуація в районах і територіальних громадах

Протягом двох останніх тижнів поріг середнього рівня інтенсивності епідемічного процесу не був перевищений жодним із районів області (рис. 2). Одна людина захворіла на COVID-19, випадків грипу не зареєстровано.

РИСУНОК 2

Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 41-й тиждень 2026 р.



У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 12,3 % - 12,6% в Охтирському та Сумському районах, на 26,2 % в Шосткинському районі; зменшилась на 4,9 % в Роменському і практично не змінилась в Конотопському районі (рис. 3).

РИСУНОК 3

Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2026-2027 рр. (показник на 100 тис. населення)



Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на рис. 4.1-4.5.

РИСУНОК 4.1

Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



РИСУНОК 4.2

Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



РИСУНОК 4.3

Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



РИСУНОК 4.4

Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу





РИСУНОК 4.5

Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



В 12 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 15).



Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Роменській (562 на 100 тис. населення), Грунській (493), Кролевецькій (471), Нижньосираватській (467), Боромлянській (447) громадах (рис. 5).

РИСУНОК 5

Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 41 тижні 2026 року

Показник на 100 тис. населення



У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 31 ОТГ області (попереднього – в 21), зменшився – в 16 (попереднього – в 25), не змінився – в 4 (мал. 6.1-6.5).

РИСУНОК 6.1

Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району



РИСУНОК 6.2

Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району




РИСУНОК 6.3

Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району




РИСУНОК 6.4

Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району





РИСУНОК 6.5

Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району




03 Захворюваність за віковими групами

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих на ГРВІ серед дітей збільшилася на 156 осіб (10,6 %), серед дорослих – на 73 (6 %). Захворюваність збільшилася з 137,4 до 145,6 на 100 тис. для дорослого населення та з 904,4 до 999,8 на 100 тис. для дитячого (рис. 7).

РИСУНОК 7


Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2026/27 років.



Вікова структура за 40-41 тиждень від аналогічного періоду попереднього сезону відрізняється більшою часткою дітей 5-9 та 10-14 років і меншою часткою дорослих віком 30-64 років. Частка дітей становить 55,4 % проти 49,1 % у попередньому сезоні (рис. 8).

РИСУНОК 8


Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2025-2026 рр. і 2026-2027 рр., Сумська область.



Школярі становлять третину всіх захворілих. Протягом тижня їхня частка зросла з 32,4 % до 33,4 % (рис. 9). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 41-го тижня року збільшилася на 104 особи з 874 до 978.

РИСУНОК 9


Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ



Протягом звітного тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності спостерігалися у віковій групі 1-4 роки (1 310,5 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зменшилась на 2,7 % серед дітей 5-9 років, на 4,7 % у віковій групі 65 років і старше, на 8,1 % серед дітей до 1 року і на 17,1 % серед дітей 15-17 років; зросла на 10,7 % серед дорослих віком 30-64 років, на 15,6 % серед дітей віком 1-4 роки, на 42,7 % серед дітей 10-14 років (рис. 10).

РИСУНОК 10

Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).



04 Госпіталізація

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 99 пацієнтів з ознаками ГРВІ проти 90 попереднього звітного періоду. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ зросла з 3,3 % до 3,4 %, що на 1,6 відсоткового пункту менше, ніж відповідний показник попереднього сезону (рис. 11). Кількість госпіталізованих дітей становить 68 осіб (68,7 % від усіх госпіталізованих).

РИСУНОК 11

Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2026-2027 рр. і 2025-2026 рр.)



05 Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 41-го тижня 2026 року дозорними лікарнями виявлено 3 дорослих пацієнтів, клінічний стан яких відповідав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). На 40-му тижні ТГРІ не були діагностовані (таблиця 1).

ТАБЛИЦЯ 1

Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 41 тиждень 2026 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП "Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди" СМР						0
КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького"			3		3	3
Всього по регіону			3		3	3

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин становить 2,6 %, у т.ч. в Сумському обласному медичному клінічному центрі інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й.Красовицького – 10 %.

У всіх 3-х пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень в одному випадку виявлено генетичний матеріал бокавірусів.

Кількість випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 41-й тиждень 2026 року зменшилася з 6 до 3. Інтенсивний показник зріс з 195,8 до 335,9 на 100 тис. населення, яке обслуговується дозорними лікарями. Усі хворі на ГПЗ – діти до 17 років.

У всіх 3-х пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень всі зразки виявилися негативними.

За два тижні з початку нового епідсезону структура збудників ГРВІ представлена риновірусами та бокавірусами (рис. 12).

РИСУНОК 12

Етіологічна структура позитивних зразків ГПЗ та ТГРІ з початку епідемічного сезону 2026/27 років.



ТАБЛИЦЯ 2

Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	Звітний тиждень			Всього за звітний тиждень	Сезон 2026 / 2027			Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	3	3	0	6	9	3	0	12
Кількість позитивних зразків абс. знач (%)	0 0 %	1 33,3 %	0 0 %	1 16,7 %	5 55,6 %	1 33,3 %	0 0 %	6 50 %
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0 %	0 0 %	0 0 %	0 0 %	0 0 %	0 0 %	0 0 %	0 0 %
Віруси грипу А, всього	0	0	0	0	0	0	0	0
А не субтипований	0	0	0	0	0	0	0	0
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	0 0 %	1 100 %	0 0 %	1 100 %	5 100 %	1 100 %	0 0 %	6 100 %
Парагрип	0	0	0	0	0	0	0	0
Аденовіруси	0	0	0	0	0	0	0	0
RS-віруси	0	0	0	0	0	0	0	0
Риновіруси	0	0	0	0	4	0	0	4
Бокавіруси	0	1	0	1	1	1	0	2
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші респіраторні збудники	0	0	0	0	0	0	0	0

На 41-му тижні року частка вірусів грипу А серед циркулюючих збудників ГРВІ продовжувала зменшуватися (рис.13).

РИСУНОК 13

Динаміка структури збудників ГРВІ, виявлених у біологічних зразках пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ, обстежених у рамках дозорного нагляду за грипом, % (епідсезон 2026-2027 рр.)



Станом на 9 жовтня 2026 року в Сумській області циркуляція вірусів грипу не підтверджена.