

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 51-й тиждень 2025 року (12.12-18.12.2025)

ГРВІ.

На 51-му тижні кількість хворих на грип та інші ГРВІ продовжувала утримуватись на передепідемічних рівнях з мінімальною зміною в абсолютних цифрах. Протягом тижня в області захворіло 3 460 осіб проти 3 404, зростання лише на 56 випадків. Інтенсивний показник склав 334,8 проти 329,3 на 100 тис. населення (рис. 1), темп приросту склав 1,7%. Низькі рівні активності респіраторних вірусів спостерігались у Кролевецькій, Путивльській, Бездрицькій та Шосткинській громадах. Епідемічні пороги не були перевищені в жодному з районів області (рис. 2). Інтенсивність епідпроцесу була на 22 % більшою, ніж в цей же час минулого року. Кількість COVID-19 також зменшилась, з 22 до 20 випадків (1,9 на 100 тис. населення). Частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ становила 0,58 %.





Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2023-24, 2024-25 та 2025-26 рр.

Продовжують з'являтися сигнали циркуляції вірусів грипу, що свідчить про близький початок епідемічного підйому, зокрема вірус грипу А виявлений системою дозорного епідеміологічного нагляду у хворого в м. Суми. Зважаючи на те, що протягом останнього та першого тижнів року кількість звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ завжди суттєво зменшується, перші сигнали про ускладнення епідемічної ситуації почнуть з'являтися з другого тижня 2026 року. Слід зазначити, що, зокрема, в Європі спостерігається активна циркуляція штаму вірусу грипу H3N2, який отримав суттєві генетичні мутації, що спричиняє більш тяжкий перебіг епідемії у

Європі. Очікується поширення даного штаму і в Україні. Тому закладам охорони здоров'я необхідно забезпечити готовність до роботи в умовах підвищеної захворюваності. Зважаючи на знижену ефективність вакцини проти грипу через появу нового штаму, можна також очікувати більшу захворюваність серед щеплених медичних працівників, що спричинить додаткове навантаження на систему охорони здоров'я.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 51 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Бездрицькій (701 на 100 тис. населення), Путивльській (600), Кролевецькій (528), Охтирській (437), Грунській (436) громадах.



Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper





Рисунок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 51-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 10,3 % - 11,6% Сумському та Шосткинському районах; зменшилась на 0,3 % - 6,4 % в Конотопському та Охтирському, на 25,4 % - в Роменському районах (мал. 3).



Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2025-2026 рр. (показник на 100 тис. населення)

Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на рис. 4.1-4.5.




Рисунок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конопотському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

В 13 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 15).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Бездрицькій (701 на 100 тис. населення), Путивльській (600), Кролевецькій (528), Охтирській (437), Грунській (436) громадах (рис. 5).




Рисунок 5. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 22 ОТГ області (попереднього – в 25), зменшився – в 25 (попереднього – в 21), не змінився – в 2, ГРВІ не реєструвались – в 2 (мал. 5.1-5.5).


Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зменшилась на 42 особи (-2,3 %), дорослих – зросла на 98 осіб (6,2%). Захворюваність зросла зі 182 до 193 на 100 тис. для дорослого населення, та зменшилась з 1137 до 1111 на 100 тис. для дитячого населення (рис. 6). Таким чином другий тиждень поспіль захворюваність серед дітей зменшується, а серед дорослих зростає.




Рисунок 6. Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2025/26 років.

Вікова структура за період з початку епідсезону практично не відрізняється від аналогічного періоду попереднього сезону. Проте відмічається поступове, але статистично значуще зростання частки дітей, яка наразі становить 50,4 %, що на 4,4 відсоткових пунктів більше, ніж у сезоні 2024/25 років (рис. 7).




Рисунок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2024-2025 рр. і 2025-2026 рр., Сумська область.

Частка школярів протягом тижня (рис. 8) зменшилась з 29,5 % до 27,9%. В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 51 тижня зменшилась на 38 осіб з 1003 до 965 (-3,8 %). Відмічається статистично значуще зростання частки школярів серед усіх захворілих протягом 40-51 тижнів у порівнянні з аналогічним періодом минулого епідемічного сезону.




Рисунок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ

Протягом звітного тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ спостерігались у віковій групі 1-4 роки (1533,9 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зросла практично на третину серед дітей до 1 року, на 13,8 % - серед дорослих віком 65 років і старше, на 2,9 % - 6,1 % - серед дітей 1-4 роки, дорослих 18-29 та 30-64 років; зменшилась на 0,7 % серед дітей віком 5-9 років, на 8,2 % – 10,5 % серед дітей 10-14 та 15-17 років (рис. 9).




Рисунок 9. Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 158 пацієнтів з ознаками ГРВІ. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ зросла з 4,1 % до 4,6 %, що на 0,9 відсоткових пункти менше відповідного показника попереднього сезону (рис. 10). Кількість госпіталізованих дітей становить 85 осіб (53,8 % від усіх госпіталізованих).

Серед загальної кількості щеплених особи з групи медичного ризику становили 8,6 %, з групи епідемічного ризику – 76,8 %, інші групи населення – 14,6 % (мал. 11).




Рисунок 11. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

Більш детальний аналіз за категоріями населення, які були залучені до вакцинальної кампанії показує, що 64,6 % від загальної кількості щеплених це працівники медичних закладів. Діти віком 6 міс – 5 років становлять 12,2%, особи віком понад 65 років – 2,7 %, особи з хронічними захворюваннями – 5,9% (рис. 12).




Рисунок 12. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

COVID-19

На 51 тижні року кількість хворих на COVID-19 зменшилась на 2 випадки, з 22 до 20 (рис. 13). Частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 останні тижні коливається в діапазоні 3,5 % – 4,8 % і звітного

тижня зменшилась до 3,1 %. Вірус SARS-CoV-2 у стічних водах в м. Суми не виділявся.




Рисунок 13. Динаміка захворюваності на COVID-19 у Сумській області у 2023-2025 рр (на 100 тис. населення)

За тиждень госпіталізовано 12 хворих з COVID-19, що становить 7,6 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ, всі дорослі (рис. 14). Частка госпіталізованих від хворих становить 60 %, що в 13 разів більше, ніж серед хворих на ГРВІ в цілому. Більшість (9 з 12) госпіталізованих – це люди віком 30-64 роки. В реанімаційних відділеннях хворих з COVID-19 нема. Смертей хворих з COVID-19 протягом тижня не було.




Рисунок 14. Кількість госпіталізованих з ГРВІ, у т.ч. з COVID-19 та частка COVID-19 в загальній структурі госпіталізованих

Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 51 тижня, як і попереднього, дозорними лікарнями виявлено 5 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Четверо з них – діти до 17 років (таблиця 1).

Таблиця 1. Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 51 тиждень 2025 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП “Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди” СМР	4				4	46
КНП СОР “Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького”		1			1	12
Всього по регіону	4	1			5	58

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин зменшилась з 3,4 % до 3,3 %. В Сумській міській дитячій клінічній лікарні ім. св. Зінаїди – з 4,9 % до 3,8 %, в Сумському обласному медичному клінічному центрі інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й.Красовицького збільшилась з 0 % до 2,3%.

У 5 пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень в 1-му зразку виявлено генетичний матеріал вірусів грипу А, в 1-му – аденовірусів, в 2-х – риновірусів, 1 зразок був негативним.

Кількість захворювань, що відповідають випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 51-й тиждень 2025 року зменшилась з 10 до 6 випадків або з 445 до 267 на 100 тис. населення, що обслуговується дозорними лікарями. Троє хворих з ГПЗ – діти віком до 17 років.

У 6-ти пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень відібраних зразків в 1-му випадку виявлено генетичний матеріал риновірусів, в 2-х – метапневмовірусів, в 1-му – SARS-CoV-2, в 3-х – інших респіраторних вірусів.

З початку поточного епідсезону в структурі збудників ГРВІ найбільшою була частка риновірусів, аденовірусів та інших не визначених збудників ГРВІ (рис. 15).

Таблиця 2. Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	51-й тиждень		Всього за 51 тиждень	Сезон 2025 / 2026		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	6	5	11	75	55	130
Кількість усіх позитивних зразків	7	4	11	56	35	91
% позитивних зразків	116.7	80	100	74.7	63.6	70
Кількість позитивних на грип зразків	0	1	1	0	1	1
% від числа позитивних зразків	0	25	9.1	0	2.9	1.1
Віруси грипу А, всього	0	1	1	0	1	1
А не субтипований	0	1	1	0	1	1
А(Н1)pdм09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій	7	3	10	56	34	90
% від числа позитивних зразків	100	75	90.9	100	97.1	98.9
Парагрип	0	0	0	8	3	11
Аденовіруси	0	1	1	5	8	13
RS-віруси	0	0	0	0	1	1
Риновіруси	1	2	3	16	10	26
Бокавіруси	0	0	0	0	0	0
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	2	0	2	4	1	5
SARS-CoV-2	1	0	1	11	0	11
Інші респіраторні збудники	3	0	3	12	11	23




Рисунок. 15. Етіологічна структура позитивних зразків ГПЗ та ТГРІ з початку епідемічного сезону 2025/26 років.

З початку епідемічного сезону 2025/26 років спостерігалась циркуляція широкого спектру збудників ГРВІ. Протягом 51-го тижня спостерігається значне різноманіття респіраторних вірусів, що виявляються в системі дозорного нагляду. Вперше з початку сезону були виявлені віруси грипу. Практично щотижня виділяються риновіруси. Аденовіруси витіснили віруси парагрипу. Продовжується циркуляція метапневмовірусів та SARS-CoV-2 (рис.16).




Рисунок 16. Динаміка структури збудників ГРВІ виявлених в біологічних зразках пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ, обстежених в рамках дозорного нагляду за грипом, % (епідсезон 2025-2026 рр.)

Станом на 19 грудня 2025 року в Сумській області спостерігається циркуляція вірусів грипу.